

Ueber
die Ernährung des Säuglings

INAUGURAL-ABHANDLUNG

zur

Erlangung der Doctorwürde

der medicinischen Facultät zu München

unter dem Präsidium

des Herrn Professors

Dr. von Hecker,

vorgelegt

von

F. S. Luhmann.

München, 1880.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41554609_0104

Ueber
die Ernährung des Säuglings

INAUGURAL-ABHANDLUNG

zur

Erlangung der Doctorwürde

der medicinischen Facultät zu München

unter dem Präsidium

des Herrn Professors

Dr. von Hecker,

vorgelegt

von

F. S. Luhmann.

München, 1880.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

An einer zweckmäßigen Ernährung ist nicht allein das Fortbestehen und Gedeihen des Kindes, sondern auch der gesunde Aufbau einer kräftigen Constitution begründet. Um die Nahrung zu bestimmen, muß vor allen Dingen den anatomisch-physiologischen Verhältnissen Rechenenschaft getragen werden. Bei der Geburt ist der ganze Digestionstract zurück, und erreicht erst am Ende des zweiten Lebensjahres seine volle Entwicklung.

Die Zähne fehlen, die Kaumuskeln sind schwach entwickelt, der harte Gaumen ist ganz flach und Speichel wird noch nicht secernirt. Bis die Dentition stattgehabt, kann die Speise nicht verkleinert und der Bissen nicht formirt werden. Die Mundhöhle ist trocken und nur ein Durchgangskanal, der Magen liegt in der Axe des Oesophagus, der Fundus ventriculi ist nur angedeutet, die Schleimhaut noch glatt, das Coecum wenig entwickelt, die Muskeln des Magens und Darmes mangelhaft. In Folge der unvollkommenen Entwicklung ist der Darm fast immer im Zustande der Ausdehnung; Gährungsprozesse, Gasbildung, sowie Catarrhe stellen sich häufig ein. Der Drüsenapparat, das Pancreas besonders, ist noch zurück. Nach Korowin ist der Pancreasfaft in den ersten drei Monaten unwirksam auf Stärke, aber im zweiten Monate beobachtete er Spuren einer zuckerbildenden Wirkung. Nach Zweifel

ist am Ende des ersten Monats der Bauchspeicheldrüsenfaft von kräftigen Kindern schon fähig Eiweiß zu verdauen und eine Wirkung auf neutrale Fette auszuüben. Die Leber bleibt bei ihrer Gröfse, aber die Gallenblafe vergrößert sich und die Secretion der Galle nimmt rafch zu. In der frifchen Leber durch Perforation getödteter Kinder find in einem Falle 1—2, in einem anderen 11 Grm. Glycogen gefunden worden. B i d d e r und S c h m i d t erhielten bei jungen Hunden und Kaninchen noch mehr Ausflufs aus der Gallenblafe als bei alten, für 1 Kilogrm. Körpergewicht. Die Leber dient im Foetalleben hauptfächlich zur Bereitung des Zuckers.

Den phyfiologischen Verhältniffen entfprechend ift die Verdauung eine rafche, weil die Nahrung nicht lange im Magen verweilen kann, fchnell weitergeht und rafch abforbirt wird, mufs fie eine flüßige, leicht affimilirbare animalifche fein, und alle Befandtheile enthalten, die zum Aufbau des Organismus nothwendig find: Waffer, Fette, Zucker, Eiweißfubftanzen und anorganifche Salze. Die von der Natur angewiefene Nahrung, Muttermilch, enthält nach G e r b e r, (Mittel aus 184 Analyfen) Waffer 87,57, Cafein und Albumin 1,95, Zucker 6,64, Fette 3,59 und anorganifche Salze 0,22⁰/₁₀. Sobald die Milch in den Magen kommt, gerinnt das Cafein und die Fette werden abgefchieden durch die Einwirkung des Pepsins, das Serum mit gelöftem Zucker und den meiften Salzen abforbirt; das Cafeingerinnfel wird durch vermehrte Salzfäure gröftentheils im Magen gelöft, in Peptone verwandelt, während der nicht gelöfte Reft im Dünndarme verdaut wird.

Der Milchkoth enthält einzelne Epithelrefte, viel Schleim, gelblich weifse Flocken (Cafein) und unverdaute neutrale Fette.

Simon fand im Kothe eines sechs Tage alten Kindes 50 Fett, 16 Gallenbestandtheile und 18% Caffein. Den trockenen Rückstand des Koths bestimmte Reichardt zu 14,8, Wegscheider zu 14,9%, von diesen waren 13,7 organische und 1,2% anorganische Bestandtheile.

Die Muttermilch enthält nicht nur Alles, das der Säugling braucht, sondern geht mit dem Alter deselben die den Verdauungskräften entsprechenden Veränderungen ein, i. e. wird reicher an Caffein und festen Bestandtheilen,

	1. Monat	2.	3.	4.	5.
Spec. Gewicht	1031,69	1033,11	1032,70	1032,90	1032,10
Wasser	872,84	872,99	886,16	889,67	888,25
Feste Theile	127,16	127,01	113,84	110,33	111,75
Zucker	40,40	43,13	43,37	44,47	44,66
Butter	39,55	34,05	31,22	27,79	27,31
Caffein	45,38	48,26	37,72	36,96	38,28
Salze	1,83	1,57	1,33	1,10	1,50
	6. Monat	7.	8.	9.	10.
Spec. Gewicht	1034,35	1034,97	1031,37	1032,88	1031,44
Wasser	901,51	891,35	889,49	891,65	889,20
Feste Theile	98,49	108,65	110,55	108,35	110,72
Zucker	42,00	44,81	41,50	45,31	45,84
Butter	16,57	24,55	22,79	23,06	25,03
Caffein	38,63	38,86	45,02	38,79	38,57
Salze	1,29	1,26	1,18	1,19	1,28
	11. Monat	12.	13—18.	19—24.	
Spec. Gewicht	1031,61	1030,68	1032,50	1030,81	
Wasser	900,63	889,04	891,34	876,55	
Feste Theile	99,37	110,96	108,66	123,45	

	11. Monat	12.	13—18.	19—24.	Vernois und Becquerel.
Zucker	47,62	43,91	45,92	41,33	
Butter	19,47	24,61	24,44	43,47	
Cafein	31,06	41,06	36,98	37,32	
Salze	1,22	1,38	1,32	1,33	

Jede gesunde Mutter, falls sie fähig ist und es ihre Stellung erlaubt, soll ihr Kind selbst stillen; indem dem Uterus Zeit gegeben wird, sich zu erholen, wird dadurch die Gesundheit gebessert und das Leben verlängert. Sociale Verhältnisse können jedoch derartig sein, daß die Mutter dem Kinde ihre ganze Zeit nicht widmen kann, und es vortheilhafter für dasselbe ist, eine Amme zu nehmen. Geschäften und Vergnügungen darf während der Stillperiode nicht nachgegangen werden.

Das Selbststillen ist contraindicirt bei folgenden Krankheiten:

- 1) Geisteskrankheit, die manchmal erblich ist.
- 2) Epilepsie, ausgenommen die Anfälle kommen höchst selten, vielleicht ein- bis zweimal im Jahre vor.
- 3) Hochgradige Hysterie, weil dann die gesammte Ernährung gestört ist.
- 4) Constitutionelle Krankheiten: Tuberculose und Syphilis.
- 5) Wiederholte Haemoptöe, Spitzenkatarrhe, chronische Pneumonie, hochgradige Herzfehler, verbreitete chronische Hautkrankheiten, Periostitis, chronische Muskel- und Gelenks-Rheumatismus.

Eine Mutter die unter 18 oder über 35 Jahre ist, kann in den meisten Fällen nicht stillen; auch kommt es vor, daß sie anscheinend gesund ist und genug Milch hat, dennoch ihr Kind nicht gedeiht, ebenfalls daß es scrofulös oder tuberculös wird, in diesen Fällen muß beim zweiten Kinde eine Amme ge-

nommen werden. Ist nun der Entschluss gefasst, eine Amme zu nehmen, muss der Arzt gewissenhaft und systematisch die Untersuchung dieser Person vornehmen, andernfalls kann er sehr leicht getäuscht werden.

Die Inspection der allgemeinen Decke: ob Narben vorhanden, die Drüsen geschwollen oder vereitert sind, eine Scrofulose überstanden wurde, Eczem, Prurigo, Psoriasis, acute Exantheme, Pustus, Scabies oder Syphilis vorliegen. Wenn Parasiten gefunden werden, sind dieselben erst zu entfernen.

Die Untersuchung der Schleimhäute: a) der Nase, ob Geschwüre, Substanzverluste oder Ozena da sind; b) der Mundhöhle, der Zunge, des Rachens, ob syphilitische oder tuberculöse Geschwüre da sind, ob das Zahnfleisch nicht bläht, locker und leicht blutet; auch soll das Gebiss in einem guten Zustande sein; c) der Geschlechtsorgane und des Afters mit dem Speculum, ob Condylome oder venerische Erkrankungen zu finden sind. Die Knochen sind wegen Auftreibungen zu betasten.

Die physikalische Untersuchung: a) der Brustorgane, ob Katarrh der Lungen, besonders Spitzenkatarrh, überstandene Pleuritis, Exsudat, Perikarditis und Herzfehler da sind; b) der Bauchorgane; Leber, Magen, Milz und Niere dürfen nicht erkrankt sein. Nachdem sämtliche Organe der Person gesund gefunden, muss die Brustdrüse untersucht werden. Dieselbe darf weder Mastitis noch wunde Warzen zeigen, muss von mittlerer Grösse sein, nicht schlaff herabhängen, schwer auf der Hand wiegen und die Venen vom Warzenhof ausgehend müssen ausgedehnt sein. Bei der Palpation muss man die einzelnen Elemente der Drüse durchfühlen; die Warze muss groß sein

und sich ausziehen lassen; die Milch leicht in mehreren Strahlen herauspritzen, auf den Daumennagel getropft die Tropfenform beibehalten und durchsichtig fein.

Das zweckmässigste Alter für das Ammengeschäft ist zwischen 18 und 35 Jahren. Eine Mehr- wird einer Erstgebärenden vorgezogen, weil sie mit der Kindspflege vertraut, und man erfährt, ob ihr Kind gedeiht und wie lange sie dasselbe gestillt hat. Die Zeit der Niederkunft der Amme soll wenn möglich mit der der Mutter übereinstimmen, jedoch darf jene zwei Monate früher entbunden haben.

Die Qualität der Kost soll gut und die Quantität grösser als normal sein, die gewohnte Lebensweise nicht geändert werden. Die Mahlzeiten und die Eintheilung derselben muss den früheren Gewohnheiten der Amme entsprechen so viel als möglich. Gemischte Kost, eiweisshaltige Nahrung ist besonders angezeigt. Schwerverdauliche Speisen, auch Fische, Austern, Krebse, Speisen die blähen, stark gesalzen oder gewürzt sind, oder viel Säure enthalten, müssen vermieden werden; ebenfalls starke Biere, faure Weine, kohlen säurehaltige Getränke, Champagner und Sodawasser. Hingegen leichte Biere, tanninhaltige Weine, Thee und Kaffee dürfen mässig genossen werden. Speisen, die die Milchsecretion besonders fördern, gibt es nicht. Jacobi hat bei träger Milchsecretion Electricität mit Erfolg angewendet. Heftige Gemüthsbewegungen üben einen nachtheiligen Einfluss auf die Milch aus. Körperliche Arbeit und Bewegung im Freien ist anzurathen. Eine bestimmte Ordnung in der Darreichung der Brust ist zu beobachten. Bei Neugeborenen bis zur 6. Woche alle $1\frac{1}{2}$ Stunden, von der 6. Woche bis zum 6. Monat alle 2 und später alle 3 Stunden.

Sobald das Kind die Brust ausläßt wird es weggethan, bestimmt also selbst, wieviel es auf einmal trinkt. Nach Bouchaud verzehrt das Kind am ersten Tage 30, am zweiten Tage 180, am dritten 450, am vierten 550, nach dem ersten Monate täglich 650, nach dem dritten 750, nach dem vierten 850 und zwischen dem sechsten und neunten 950 Gramm Muttermilch. Die Brüste sollen abwechselnd gegeben, das Kind nie im Schlafe gestört werden und nicht des Nachts an der Brust schlafen.

Das Stillen ist zu unterbrechen und die Amme zu wechseln:

1) Wenn sich die Menstruation früh einstellt und die Ernährung des Kindes darunter leidet.

2) Sobald Schwangerschaft eintritt, weil dann die Milch Veränderungen eingeht, die dem Kinde schädlich sind. Nach N. Davis nehmen die festen Theile, besonders Fette, Salze, Caffein ab und Colostrum zeigt sich.

3) Wenn es sich um schwere und ansteckende Krankheiten handelt.

4) Wenn das Kind nicht gedeiht.

Die künstliche Ernährung ist nur dann gestattet, wenn die Mutter nicht tauglich oder keine Amme zu haben ist. Künstlich ernährte Kinder neigen zu Darmkatarrhen, die leicht chronisch werden, zur Scrofulose und Rachitis, haben immer ein blaßes Colorit und ein großer Percentsatz geht zu Grunde, der bei der natürlichen Ernährung am Leben bleiben würde. Bei der Milchdiät wird abnorme Säurebildung durch die Umwandlung des Milchzuckers in Milchsäure bedingt (nach Leube durch die Einwirkung von Vibrionen); später bei amylenreicher Nahrung gibt die Umsetzung der Stärke in Traubenzucker,

wenn dessen Aufsaugung durch die Darmschleimhaut verzögert wird, Anlaß zur Milchsäuregärung und zum Darmkatarrh.

Die Kuhmilch enthält nach Gerber (Mittel aus 128 Analysen) Wasser 86,23, Casein und Albumin 3,70, Zucker 4,93, Fette 4,51 und Salze 0,61%, kommt also zuerst in Betracht, da sie der Muttermilch sehr ähnlich ist; unterscheidet sich jedoch von dieser, indem sie caseinreicher, auch ihr Casein von einer anderen Beschaffenheit ist, da es grobflockiger gerinnt wenn mit Säuren behandelt und folglich nicht so leicht verdaut wird. Die Verdünnung soll die Regelung des Caseins bezwecken.

1. bis 3. Woche 1 Theil Milch und 2 Theile Wasser.
 3. „ 12. „ 1 „ „ „ 1 Theil „
 12. Woche bis 6. Monat 3 Theile „ „ 1 „ „

Später, wenn das Kind sie verträgt, pure Milch. Gewöhnlich reagirt Kuhmilch sauer; um dieselbe zu neutralisiren, gibt man 1½% Natron bicarb. Lösung 1 Eßlöffel voll zu jeder Portion, auch etwas Zucker oder Milchzucker. Die Kuh soll einige Monate früher geworfen haben, wenig Milch geben, ihre Nahrung im Freien suchen, oder in einem ventilirten Stalle, nicht mit Schlempe und Abfall, sondern mit guter Nahrung gefüttert werden. Wenn es möglich ist, gibt man die Milch warm von der Kuh; kann dieses nicht geschehen, so muß dieselbe abgekocht, etwas Zucker hinzugesetzt, aber der Rahm nicht abgeschöpft werden.

Man gibt von der Mischung:

- In der 1. Lebenswoche 1—3 Eßlöffel voll, 15—45 Grm.
 „ „ 2. „ „ 3—4 „ „ 45—60 „
 „ „ 3. „ „ 4—5 „ „ 60—75 „

In der 4. Lebenswoche 5—6 Eßlöffel voll, 75—90 Grm.

In dem 2. Lebensmonat 7—9 „ „ 100—140 „

und steigt allmählig bis zu 12 Eßlöffel voll, 200 Grm. Die Milchmenge hängt jedoch sehr viel von dem Körpergewichte und der individuellen Assimilationsfähigkeit des Kindes ab. Die Nahrung mit einem Löffel zu geben, ist unzweckmäßig, da das Kind zuviel Luft schlucken würde. Eine einfache Glastüte mit einem Ansatz von decalcinirtem Elfenbein als Mundstück ist der jetzt allgemein gebrauchten Flasche mit langem Gummischlauche, weit vorzuziehen, weil letztere schwer zu reinigen ist und sich leicht abnorme faure Gährungen bilden, die dem Kinde Dyspepsie verursachen. Scrupulöse Reinlichkeit muß bei den Saugflaschen beobachtet werden, wenn Soor und Verdauungsstörungen vermieden werden sollen. Durch Zusatz von aromatischen Abkochungen, Fenchel, Kamillen, gewinnt die Verdaulichkeit der Milch nicht, hingegen werden schleimige Flüssigkeiten oft sehr gut vertragen. Jacobi empfiehlt sehr warm Hafer Schleim, und wenn sich Diarrhoe einstellen sollte Gerstenschleim; auch wird der Zusatz von Kalbsbrühe, selbst bei Kindern, die die einfach alkalisirte Milch nicht verdauen, sehr gut vertragen. Für junge Säuglinge nimmt man $\frac{1}{4}$ Kilo Fleisch auf 1 Liter Wasser; für ältere $\frac{1}{2}$ Kilo auf $1\frac{1}{2}$ Liter, auch muß etwas Salz hinzugefügt werden. Kalbsbrühe reagirt neutral und wird in derselben Weise mit der Milch gemischt wie das Wasser.

Es gibt eine Masse Surrogate, wovon das Prototyp die Liebig'sche Suppe ist, die in folgender Weise leicht zubereitet wird:

1. Man nimmt 1 Eßlöffel voll Malzmehl, dazu 50 Gramm 2⁰/₀ Kali bicarb. oder Kali carb. Lösung, mischt, erwärmt langsam und läßt $\frac{1}{2}$ Stunde stehen.
2. 1 Eßlöffel voll Weizenmehl, mischt langsam damit 10 Loth Milch bei gelindem Feuer und läßt dieses zum Kochen kommen.
3. Wenn kalt, werden beide Portionen zusammen gemischt, zum Kochen gebracht und die Suppe ist fertig. Bis zum 6. Monate wird sie verdünnt, ungefähr im Verhältnisse wie die Kuhmilch gegeben, nachher kann sie pur genossen werden.

Für Neugeborne ist frische Kuhmilch der Suppe vorzuziehen, aber als diätetisches Mittel bei chronischen Darmkatarrhen ist sie unentbehrlich, da man Kinder beobachtet, die zu einem Skelet abgemagert, bei denen kein Mittel mehr wirkt, durch den Gebrauch dieser Suppe genesen; ebenfalls ist sie der Kuhmilch nach der Entwöhnung vorzuziehen. Da die Suppe immer frisch zubereitet werden muß und nicht immer gelingt, haben Löfflund und Liebe ihre Kinder-nahrung bereitet, welche mit verdünnter Milch die Liebig'sche Nahrung herstellt. Die Suppe aus diesen Präparaten zubereitet, ist jedoch nicht so gut als die frische.

Da man die Milch nicht immer gut und in einem frischen Zustande haben kann, ist man auf die Idee gekommen, dieselbe zu condensiren. Die Milch wird abgedampft, mit Zucker behandelt und luftdicht verschlossen und enthält nach Gerber Wasser 28,24, Caffein und Albumin 9,41, Fette 8,64, Zucker und Milchzucker 51,56, Salze 2,13. Microscopisch findet man

Milchkügelchen und granulirten Zucker, und wenn die Büchsen im Sommer offen stehen, Pilze und faure Gährung.

Für Neugeborne:

1.—3. Woche,	1 Theil	condensirte Milch*	zu 15 Th.	Wasser
3.—6. „ „ „ „ „ „	14 „ „			
3.—6. Monat angefangen	1 Theil	„ „	12 „ „	
8.—9. „ „ „ „ „ „	10 „ „			

Kinder find bei dieser Nahrung immer blass, leiden viel an Dyspepsie, Meteorismus und Kolikanfällen. Bei der Entwöhnung ist diese Milch zu verwenden, wenn man keine frische bekommen kann, ebenfalls auf Reisen nicht zu entbehren, da mancher Darmkatarrh dadurch erspart wird.

Unter den Kindermehlen ist das von Nestlé zu erwähnen, die andern find diesem nachgemacht und felten von so feiner Qualität. Das von Faust und Schuster in Göttingen enthält nach Prof. von Uslar's Analyse: Proteinstoffe 11,51, Kohlenhydrate 79,61, Salze 1,80, Feuchtigkeit 6,73. Das Anglo-Swiss Kindermehl enthält nach ihrer eigenen Analyse: Proteinstoffe 14,5—15, Kohlenhydrate 70,0—72,0, Salze 2—2,25 und Feuchtigkeit 5—6%. Letzteres soll nicht so viele unlösliche Stoffe enthalten, wird aber nicht gerne von den Kindern genommen. Vor dem dritten Monat wird ein Kindermehl felten vertragen, doch als Beigabe zur Milch ist es bei älteren Kindern verwendbar, ein bis zweimal täglich. Einem Kinde 3—4 Monate alt, gibt man 1 Theil Kindermehl zu 6 Theilen Wasser und bringt die Mischung zum Kochen.

Da viel Cafein bei der Ernährung durch Kuhmilch in einem unverdauten Zustande im Stuhle abgeht, hat Biedert diesem Uebelstande abzuhelfen gesucht, indem er in seinem

Rahmgemenge den Cafeingehalt der Kuhmilch vermindert, und durch den vermehrten Fettgehalt ihn verdaulicher macht.

1. $\frac{1}{8}$ Liter füßen Rahm, dazu $\frac{3}{8}$ Liter Wasser und 15 Gram Milchzucker = Cafein $1^0/0$, Butter 2,4, Zucker $3,8^0/0$.

Das Kind wird jede Woche gewogen und sobald es nicht mehr zunimmt, fetzt man Kuhmilch hinzu.

2. $\frac{1}{8}$ Liter Rahm, $\frac{3}{8}$ Liter Waffer, $\frac{1}{16}$ Liter Milch und 15 Gramm Milchzucker = Cafein 1,4, Butter 2,6 und Milchzucker $3,8^0/0$.

Treten Verdauungsstörungen ein, Diarrhoe, Erbrechen u. f. w., so geht man zurück auf die vorige Mifchung, nimmt das Kind nicht mehr zu, gibt man die folgende. Diese Regel gilt für jede Mifchung.

3. $\frac{1}{8}$ Liter Rahm, $\frac{3}{8}$ Liter Waffer, $\frac{1}{4}$ Liter Milch und 15 Gramm Milchzucker = Cafein 1,8, Butter 2,7, Milchzucker $3,8^0/0$.

4. $\frac{1}{8}$ L. Rahm, $\frac{3}{8}$ L. Wasser, $\frac{1}{4}$ L. Milch und 15 Gramm Milchzucker = Cafein 2,3, Butter 2,9 und Milchzucker $3,8^0/0$.

5. $\frac{1}{8}$ L. Rahm, $\frac{3}{8}$ L. Milch und 15 Gr. Milchzucker = Cafein 2,6, Butter 2,0 und Milchzucker $3,8^0/0$.

Kann mehr Cafein verdaut werden, so läßt man den Rahm weg.

6. $\frac{1}{2}$ L. Kuhmilch, $\frac{1}{4}$ L. Waffer und 10 Gr. Milchzucker = Cafein 3,2, Butter 2,8 und Milchzucker $4^0/0$.

Trotz der Einwendung Jacobi's, dass die Milch zur Zeit der Rahmgewinnung schon in voller Gährung begriffen fei, zeigt das Verhalten des Darmes und das Wohlbefinden der mit dieser Methode genährten Kinder, dass das Verfahren gut ift. Die Portionen müßen genau abgemessen werden,

diefes geschieht nur, wenn man es mit gewiffenhaften und gebildeten Leuten zu thun hat. Um die Schwierigkeiten diefes Verfahrens zu überwinden, auch um es der Armenpraxis zugänglich und in derfelben verwendbar zu machen, hat Biedert das künftliche Rahmgemenge (Kalialbuminat) zubereitet.

Einem neugebornen Kinde gibt man 1 Theil Rahmgemenge zu 16 Theilen Waffer; fobald es nicht mehr zunimmt wird Kuhmilch zugefetzt. Die Regeln find diefelben wie bei dem frifch zubereiteten Rahmgemenge. Wenn es fich in den Büchfen hält, auch im Sommer nicht in Gährung übergeht, wird daffelbe eine grofse Verbreitung erlangen, denn die bisher mit frifchen Büchfen angestellten Verfuche liefern fehr günstige Refultate, doch müffen noch zahlreiche Erfahrungen im Grofsen und Ganzen gemacht werden, bevor man ficher ift, dafs es ganz feinem Zwecke entspricht.

Bei der künftlichen Ernährung ift es von der höchften Wichtigkeit, dass man fich überzeuge, ob das Kind zunimmt, defshalb mufs es wöchentlich oder alle zwei Wochen gewogen werden. Normaliter verliert es bis zum dritten und vierten Lebenstage 200—250 Gramm, $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{14}$ feines Körpergewichtes, und erlangt erft das Gewicht der Geburt wieder am neunten bis zehnten Tage; wird es künftlich ernährt, fo dauert der Gewichtsverlust bis zum fünften und fechften und wird erft am zwölften bis fünfzehnten Tage wieder erlangt. Nimmt man das Normalgewicht eines Neugebornen als 3200—3500 Gr. an, fo ergeben fich folgende Durchschnittszahlen:

Lebensmonat.	Tägliche Zunahme.	Monatl. Zunahme.	Gesammt-Gewicht.
1.	25—35,0	750	4000 Gr.
2.	23	700	4700 „

Lebensmonat.	Tägliche Zunahme.	Monatl. Zunahme.	Gesammt- Gewicht.
3.	22	650	5350 Gr.
4.	20	600	5950 „
5.	18	550	6500 „
6.	17	500	7000 „
7.	15	450	7450 „
8.	13	400	7850 „
9.	12	350	8200 „
10.	10	300	8500 „
11.	8	250	8750 „
12.	6	200	8950 „

Diese Zahlen geben beiläufig einen Anhaltspunkt für die Wägung des Kindes. Man sehe darauf, daß keine einseitige Ernährung, starke Entwicklung des Fettes und Zurückbleiben der Muskeln, oder chronischer Hydrocephalus da ist, sonst trägt das Gewicht sehr.

Bei allen Methoden der künstlichen Ernährung muß besonders betont werden, daß nicht ein jedes Kind sie verträgt und sobald sich Verdauungsstörungen einstellen oder das Kind im Wachsthum zurückbleibt, nicht lange zu experimentiren oder mediciniren, sondern ihm die Brust zu verschaffen ist, um es am Leben zu erhalten.

